

Penicilline-allergie

Informatiebrochure

**Ben jij
allergisch voor
penicilline?**

- JA
 NEE
 MEER ONDERZOEK NODIG



Mogelijk allergisch aan penicillines

Uit de bevraging is gebleken dat u mogelijk een allergie hebt voor penicillines.

Wanneer u niet meer weet welke reactie u heeft gehad of de symptomen zich beperken tot jeuk, maculopapuleus exantheem meer dan 10 jaar geleden of andere symptomen die niet geassocieerd zijn met een peni-allergie, dan heeft u een laag risico op penicilline-allergie en is een bijkomende test aanbevolen (tolerantietest).

Indien u nog weet welke allergische symptomen u heeft ontwikkeld (vb. huiduitslag, ademhalingsklachten, zwelling van de lippen/gezicht/keel/tong) na inname van penicilline antibiotica of u bent op spoed beland, dan is de kans groot dat het om een echte allergie gaat. In dit geval heeft u een intermediair of hoog risico op penicilline allergie.

Laag risico

Wanneer u een laag risico heeft op penicilline allergie, dan is verder onderzoek aanbevolen in de vorm van een orale **tolerantietest**. In afwachting van deze tolerantietest werd het label in uw dossier aangepast, zodat andere zorgverleners weten dat dit allergie-label nog niet bevestigd is.

Tolerantietest

Een tolerantietest bestaat uit een korte opname op het dagziekenhuis waarbij u één pil penicilline antibiotica (1g amoxicilline) zal toegediend krijgen. Na de inname blijft u 1 uur in het ziekenhuis ter observatie, in veilige gecontroleerde omstandigheden. De arts-specialist (= allergoloog) komt controleren of het al dan niet gaat om een allergische reactie. De kostprijs van een tolerantietest bedraagt 25 euro (korte opname in het dagziekenhuis en één pil penicilline antibiotica). Daarbijkomend komt het remgeld van een consultatie bij de allergoloog (12 euro). Afhankelijk van uw klinische toestand kan een tolerantietest uitgevoerd worden tijdens een hospitalisatie (inbegrepen in ligdagforfait).

In zeldzame gevallen kan een laattijdige reactie thuis optreden. Dit is een reactie die later (binnen 1 week) of pas na meerdere penicillinetoedieningen optreedt. In dat geval dient u de allergoloog op de hoogte te brengen (zie contactgegevens op het einde van deze brochure).

Als u geen allergische reactie ontwikkelt tijdens dit onderzoek of geen laattijdige reactie ontwikkelt, dan bent u **niet allergisch voor penicilline** en kan het label verwijderd worden uit uw dossier. **Deze soort antibiotica kunnen dus veilig ingenomen worden.**

Als u **wel een allergische reactie** ontwikkelt, dan gaat het om een **intermediair of hoog risico**. In dit geval wordt uw allergie bevestigd en wordt dit ook in uw dossier genoteerd.



Intermediair of hoog risico

Wanneer u een intermediair of hoog risico heeft op penicilline allergie, dan wordt verder onderzoek bij de arts-specialist (= allergoloog) aanbevolen. Door verdere testen (intradermale testen) te laten uitvoeren, kunnen naast de verdachte soort penicilline ook gelijkaardige antibiotica getest worden. Voor patiënten met een echte penicilline-allergie is het mogelijk om zo een goed alternatief antibioticum te vinden.

Waarom is een correct label belangrijk?

Bij patiënten die beweren penicilline-allergisch te zijn, wordt in geval van infectie vaak andere antibiotica voorgeschreven. Deze alternatieve antibiotica brengen meer risico's met zich mee, zoals

- Meer bijwerkingen.
- Een hogere kans op andere soorten infecties.
- Vaak moeilijker om de infectie te behandelen.
- Hogere kostprijs van de alternatieve antibiotica.
- Langere opname in het ziekenhuis.

U wil dus zeker weten dat uw label 'penicilline-allergie' correct is, zodat u in de toekomst de meest gepaste antibiotica krijgt wanneer u dit nodig hebt.

Wat is penicilline?

Penicilline is een soort antibioticum. Penicillines maken deel uit van een grotere groep antibiotica (bèta-lactamantibiotica) die vaak gebruikt worden om bacteriële infecties te behandelen. Dit kan via pillen, injecties of een infuus rechtstreeks in de bloedbaan. Bij sommige infecties kunnen antibiotica van levensbelang zijn, maar een behandeling met antibiotica brengt vaak ongemakken met zich mee (bv. diarree).

Wat is penicilline-allergie?

Bij een penicilline-allergie ontstaat een overgevoelighedsreactie. Dit betekent dat het afweersysteem van ons lichaam onnodig reageert tegen penicillines. Deze overgevoelighedsreacties kunnen onmiddellijk of pas laattijdig optreden. Ze kunnen gepaard gaan met huiduitslag, ademhalingsklachten en bloeddrukval. Soms zijn deze reacties levensbedreigend, zoals bij zwelling van de keel.

Een echte penicilline-allergie komt niet zo vaak voor. Patiënten krijgen tijdens hun behandeling met een antibioticum vaak last van maag-darmklachten, een schimmelinfectie, hoofdpijn, duizeligheid of geïsoleerde gewrichtsklachten. Deze bijwerkingen kunnen voorkomen bij alle types van antibiotica, want het gebruik van antibiotica doodt ook de goede bacteriën die altijd op en in ons lichaam leven. Hierdoor krijgen andere kiemen de kans om zich te vermenigvuldigen en veroorzaken dan bijvoorbeeld diarree of schimmelinfecties.



Contactgegevens

Secretariaat allergologie - pneumologie

Vragen over uw allergie-label T 051 42 51 60 interne@sintandriestielt.be

Kasdienst

Vragen ivm de kostprijs T 051 42 50 97 kasdienst@sintandriestielt.be

HOST TRIaz

Voor meer informatie over het project delabeling penicilline-allergie:

<https://triaz.be/host/activiteiten-en-projecten/delabeling-van-penicilline-allergie>



Weetjes

- 15% van alle patiënten geeft aan een penicilline-allergie te hebben.
- **Meer dan 90%** van deze patiënten blijkt uiteindelijk **niet allergisch** te zijn voor penicilline.

Hoe komt dit?

- Veel patiënten hebben in hun kindertijd het label 'penicilline-allergisch' gekregen nadat ze een bijwerking van het ingenomen antibioticum hebben vertoond. Een bijwerking wordt vaak verward met een echte allergie.
- Patiënten kunnen uit hun allergie groeien. Als de allergie dateert van meer dan 10 jaar geleden, is de kans groot dat er geen sprake meer is van een allergie.



Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Bron: Ziekenhuishygiëne, Sint-Andriesziekenhuis 03 februari 2025, art.5038_200

03/02/25

