



Ontslag

Afhankelijk van wat u vooraf met de arts heeft afgesproken, mag uw kind het ziekenhuis verlaten of wacht u nog even tot dat de kinderarts met u overlegd heeft.

Meer info?

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op de kinderafdeling.

Kinderartsen

Dr. De Jaeger Kristien

Dr. Evens Kristien

Dr. Persyn Joke

Dr. Dinneweth Delphine

Dr. Vandenbroeck Peter

Kinderafdeling

T 051 42 52 70

<https://kinderafdeling.sintandriestielt.be>

Bron: kinderafdeling Sint-Andriesziekenhuis,
02 september 2024, art.4248_100



Uw gezondheid, onze zorg.

**Kinderafdeling
T 051 42 52 70**

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Lactose-ademtest

Informatiefolder



02/09/24





Beste ouder(s)

Binnenkort wordt uw kind op de kinderafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis opgenomen voor een lactose-ademtest.

Aan de hand van deze folder willen wij u graag informeren over de lactose-ademtest en een antwoord bieden op de vragen die u zich eventueel stelt. Indien u nog vragen heeft na het doorlezen van deze folder, kunt u deze aan de arts of verpleegkundige stellen.

Wat is een lactose-ademtest?

Bij deze test wordt waterstofgas of H₂ in de uitgeademde lucht gedoseerd om na te kijken of iemand melksuiker (lactose) al dan niet volledig opneemt en verteert. Deze test wordt ook gebruikt om te onderzoeken of er te veel bacteriën in de dunne darm aanwezig zijn.

Dagopname

Bij aankomst in het ziekenhuis, dient u zich aan de receptie in te schrijven voor dagopname. Na de inschrijving zal u worden doorverwezen naar de kinderafdeling op de derde verdieping waar een verpleegkundige op u wacht.

Wat moet u meebrengen?

- Kids ID of ISI-kaart

Vorbereiding

Het is belangrijk dat uw kind nuchter is. Dit betekent dat uw kind 8 uur voor het onderzoek niets meer mag eten of drinken.

Het onderzoek

Om het H₂ te kunnen meten, moet het eerst opgevangen worden in een zakje van ongeveer 1 liter. Op het zakje zit een mondstuk of masker waarin uw kind moet blazen. Nadien trekken we met een spuit lucht op uit het zakje. Zo krijgen we een nuchtere waarde of een nulmeting.

Daarna moet uw kind een drankje drinken waarin lactose zit. Daarna moet uw kind om de 30 minuten in het zakje blazen. Telkens wordt het staal in een spuit verzameld. In totaal duurt de test 4 uur.

Tijdens de test mag uw kind niet eten of drinken en moet uw kind rustig blijven.

