

Gastroscoopie

maagonderzoek - ambulant
Informatiebrochure




Doel van gastroscopie

Bij een gastroscopie wordt een soepele sonde (gastroscoop) gebruikt om de binnenkant van de slokdarm, de maag en het duodenum (= twaalfvingerige darm, het begin van de dunne darm) te onderzoeken.

Het onderzoek wordt meestal gebruikt om:

1. Eventuele letsels te zien en zo de reden te achterhalen van slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, zuurbranden, maagbloeding, indigestie, buikpijn of pijn op de borst
2. Zo nodig stukjes weefsel van de slokdarm, maag of dundarmwand te nemen (= biopsies) voor microscopisch onderzoek
3. Zo nodig een behandeling uit te voeren (poliepen wegnemen, bloedingen stoppen, een vernauwing verbreden...)



Verloop van het onderzoek

Het onderzoek gebeurt in principe door de maag-darm specialist van uw keuze. In geval van onvoorziene omstandigheden en/of tijdens verlofperiodes, kan het onderzoek echter door een andere collega gastro-enteroloog van de dienst uitgevoerd worden. Gezien de dienst gastro-enterologie wettelijk erkend is als opleidingscentrum voor toekomstige gastro-enterologen kan het gebeuren dat een procedure uitgevoerd wordt door een geneesheer specialist in opleiding, ons toegewezen vanuit universitaire centra. Deze procedure gebeurt dan echter steeds onder strikte supervisie van de aanwezige erkende gastro-enterologen in ons ziekenhuis.

Het onderzoek is niet pijnlijk. Bij het begin van het onderzoek wordt de achterzijde van de mond en de keel met een spray lokaal verdoofd om de braakreflex te onderdrukken. Eventueel en op aanvraag kan het onderzoek ook onder een zacht sederend (= slaapverwekkend) middel gebeuren of onder volledige algemene verdoving (via dagopname dan wel).

De duur van elk onderzoek is variabel, meestal tussen de 5 à 10 minuten. Bij het onderzoek ligt u op de linkerzijde. De gastroscoop is een fijne, soepele buis met een diameter van 9 mm die via de mond en keel wordt ingebracht in de slokdarm en verder wordt opgeschoven om de maag en de twaalfvingerige darm te onderzoeken. U wordt dus niet gehinderd bij het ademen want de gastroscoop gaat niet in de luchtwegen of sluit deze niet af. Tijdens het onderzoek wordt gevraagd kalm te ademen en het speeksel uit uw mond te laten lopen (niet slikken!).

De gastroscoop bevat zeer fijne vezels en een microcamera op het uiteinde die is aangesloten op een tv-toestel. Zo kan de arts rechtstreeks de binnenzijde van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm bekijken (kleurenbeeld). Zo nodig kunnen doorheen de gastroscoop andere instrumenten ingebracht worden voor het afnemen van weefselstalen (voor later onderzoek onder de microscoop), dit is pijnloos. Ook kan men zo behandelingen uitvoeren (stelpen van bloedingen, wegnemen van poliepen, openmaken van vernauwingen, ...). Via de gastroscoop kan lucht worden ingeblazen en vocht worden afgezogen om het zicht te verbeteren; hierdoor kunt u eventueel lucht opboeren.



Verloop na het onderzoek

Na het onderzoek kan u nog even bekomen op de "recovery" (ontwaakruimte) tot het slaapverwekkend middel dat u eventueel kreeg grotendeels uitgewerkt is (1/2 à 1 uur). Soms kunt u nog een opgeblazen gevoel in de maagstreek hebben. Dit is te wijten aan de lucht die bij het onderzoek werd ingeblazen. Deze last verdwijnt wanneer u de lucht opboert. Soms kan de keel nog een tijdlang geïrriteerd zijn.

Enmaal volledig bekomen, wordt u naar de wachtzaal teruggebracht en zal uw behandelend maag-darmspecialist u binnenroepen in zijn bureau voor het bespreken van de resultaten. Het resultaat van eventuele weefselstukjes en het microscopisch onderzoek ervan (biopsies, poliepen ...) wordt rechtstreeks opgestuurd naar uw huisarts. Dit resultaat wordt ook verwerkt in een definitief medisch verslag dat zo snel als mogelijk voor uw huisarts wordt opgemaakt en hem/haar wordt opgestuurd.

Omwille van de verdoving van mond en keel mag u niet eten of drinken tot deze verdoving uitgewerkt is, wegens het gevaar op verslikken. Dit duurt gemiddeld 30 minuten tot één uur. Het is mogelijk, afhankelijk van de diagnose of een behandeling uitgevoerd tijdens het onderzoek, dat uw arts u vraagt nog een langere tijd nuchter te blijven.

Als u een sederend middel via de ader kreeg ingespoten, dient u voor het vervoer naar huis beroep te doen op iemand anders (partner, familielid, vriend). Uzelf mag de dag van het onderzoek geen auto meer besturen, geen gevaarlijke activiteiten uitvoeren of belangrijke beslissingen nemen (zoals hoogte beklimmen, dakwerken uitvoeren, computer programmeren, contracten afsluiten), zelfs als u zich kiplekker voelt. Uw reflexen en beoordelingsvermogen kunnen immers voor de rest van de dag verminderd zijn door de verdoving.



boven 100° C. Vóór elk nieuw gebruik wordt de gastroscop grondig gereinigd en gedesinfecteerd volgens de recentste internationale wetenschappelijke normen en de bestaande wetgeving terzake. Hoewel infectie nooit volledig kan uitgesloten worden, is dit toch extreem zeldzaam.

Wenst u hierover meer details, bespreek dit dan vooraf met uw arts.

Kostprijs onderzoek

De artsen gastro-enterologen zijn geconventioneerd en gebruiken de door het RIZIV erkende tarieven.

Bij het onderzoek kan "single use" materiaal (= voor eenmalig gebruik) gebruikt worden (bv. voor wegname poliepen, afname weefselstukjes, stoppen bloedingen...). Geheel conform de Belgische wetgeving wordt hiervoor een forfait aangerekend.

Bij elke ambulante verstrekking wordt ook een klein bedrag voor verbruiksmateriaal aangerekend ('materiaalkost').

De kostprijs van het onderzoek hangt tenslotte ook af van het al dan niet uitvoeren van bijkomende, noodzakelijke procedures. Een prijsindicatie kan opgevraagd worden via het secretariaat interne.



Vragen en info

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over dit onderzoek? Aarzel dan niet om deze voor uw onderzoek aan uw behandelend arts te stellen. Mocht u om dringende redenen uw afspraak niet kunnen nakomen, verwittigt u zo spoedig mogelijk het secretariaat inwendige geneeskunde. Er kan dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Secretariaat maag-, darm- en leverziekten

T 051 42 51 60

website www.gastrotielt.be

interne@sintandriestielt.be

1ste verdiep Route 30 wachtzaal C

Artsen

- Dr. De Coninck Steven
- Dr. Baertsoen Chantal
- Dr. De Decker Evelyne
- Dr. De Zutter Astrid

Spoedopname

Buiten de kantooruren, in het weekend en op feestdagen kunt u voor dringende problemen langskomen tot de dienst spoedgevallen van het Sint-Andriesziekenhuis, voor vragen spoeddienst T 051 42 50 67

Sint-Andriesziekenhuis

Bruggestraat 84
8700 Tielt

website www.sintandriestielt.be

T 051 42 51 11 algemeen onthaal ziekenhuis

Uw onderzoek gaat door op:

datum:

uur:

Aanmelden aan de kiosk in de inkomhal - gelijkvloers





Uw gezondheid, onze zorg.

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tiel
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

Inwendige Ziekten

T 051 42 51 60
interne@sintandriestielt.be
www.gastrotielt.be



17/03/25

