

De ingreep


Voor de behandeling zal de anesthesist u via het infuus een korte verdoving toedienen. Hierdoor zal u een paar minuten slapen waardoor de behandeling vlot en pijnloos kan verlopen. Vanaf dat moment merkt u zelf niets meer van de behandeling. Indien nodig wordt eerst een echografie via de slokdarm uitgevoerd om klonters in het hart uit te sluiten (cfr. voorbereiding)

Men brengt nu op twee plaatsen op de borst een soort klever aan ter bescherming van de huid om te voorkomen dat door de elektrische stroom plaatselijke verbranding zou optreden.

Op de beschermingssticker plaatst men daarna de twee klevende shockelektroden waarlangs de kortstondige elektrische shock wordt toegediend. Op de hartmonitor kan men onmiddellijk aflezen of uw hart een normaal hartritme herneemt.

Soms lukt dit niet bij de eerste poging en is het noodzakelijk deze stroomstoot te herhalen. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag.

Complicaties van de behandeling komen uiterst zelden voor. De narcoseperiode is namelijk heel erg kort en geeft zelden complicaties. Omdat u onder narcose gebracht werd is het verboden om zelf met de wagen rijden. Het is mogelijk dat de huid op de plaats waar de shock werd toegediend, ondanks de beschermingsklevers, licht geprikkeld wordt. Dit wordt door de verpleegkundigen gecontroleerd. In die gevallen wordt bv. Flammazine aangebracht, wat u thuis nog enkele dagen kunt verder zetten. Deze complicatie verdwijnt meestal enkele dagen nadien.



Ontslag uit het ziekenhuis

Na de behandeling komt u vrij snel terug bij bewustzijn. U hebt op dat moment meestal een masker op waarlangs wat zuurstof wordt toegediend (zelden zit er een canule in uw mond om de luchtweg vrij te houden). Ook dit wordt vrij snel verwijderd. Daarna wordt u terug naar het dagziekenhuis gebracht. Nadien blijft u best nog enkele uren op uw bed liggen. De verpleegkundige zal u zeggen wanneer u terug mag opstaan. Hebt u iets nodig, aarzel niet om de verpleegkundigen aan de hand van uw alarm te verwittigen. Ten slotte zal het infuus verwijderd worden.



Voor de ambulante patiënten

Afhankelijk van uw behandelende arts en het uur waarop de behandeling werd uitgevoerd, mag u dezelfde voormiddag naar huis. De arts evalueert op dat moment ook uw medicatie. Uw huisarts wordt volledig op de hoogte gebracht, en zorgt voor de verdere opvolging. Er wordt een controle afspraak gemaakt bij de cardioloog.

Vragen en info

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over dit onderzoek? Aarzel dan niet om deze voor uw onderzoek aan uw behandelend arts te stellen.

Mocht u om dringende redenen uw afspraak niet kunnen nakomen, verwittigt u zo spoedig mogelijk het secretariaat cardiologie. Er kan dan een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Secretariaat cardiologie

T 051 42 58 70

cardiologie@sintandriestielt.be

- Dr. Desimpel Françine
- Dr. Vanderheeren Philippe
- Dr. Bresseleers Jan
- Dr. Defruyt Loran
- Dr. De Coster Margot

Sint-Andriesziekenhuis
Bruggestraat 84
8700 Tielt

www.sintandriestielt.be

Hartcentrum Aalter
Lindestraat 20
9880 Aalter

www.hartcentrumaalter-tielt.be

Spoedopname

T 051 42 50 67





Uw gezondheid, onze zorg.

Dienst Cardiologie
T 051 42 58 70

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
T 051 42 51 11 - F 051 42 50 20
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

03/03/25

